Auch Harpalus rotundicollis findet sich doppelt, Frm. und Kolen., ebenso Chrysomela coerulea, von Germar und Olivier.

Eine Reihe nomenclatorischer und synonymischer Bemerkungen giebt Hr. von Harold im 2. Heft der Verhandlungen des Münchener Entom. Vereins, 1877, S. 113—125. Es sind hierbei die neuesten synonymischen Forschungen berücksichtigt worden, die in dem Münchener Katalog noch keine Aufnahme finden konnten. Die beigegebene Seitenzahl des Katalogs trägt zur Bequemlichkeit des Auffindens bei. Am Schlusse sind aus J. Sahlberg's Enum. Col. Fenn. I, 1876 (Sphaphylinidae) noch eine Anzahl neuer Arten nachgetragen.

Ein Fangzeug für die Winterjagd auf Insecten, die sich unter den Flechten und Moosen, resp. der Rinde der Bäume aufhalten, brachten die Ent. Nachr. schon früher; heute können wir dies Instrument nach einer Mittheilung von E. Delaby in Bull. Soc. Linn. N. France, 66 noch vereinfachen und verbessern. Ein Sack aus Baumwollzeug trägt oben eine Schnürrinne von 2 cm Breite, in die man ein Rohrstäbchen von 5 mm Dicke stecken kann. Der Umfang dss Sackes beträgt an der oberen Oeffnung 85 cm, die Tiefe 50 cm, die Länge des Stäbchens 61 cm. Es liegt auf der Hand, dass jeder nach Belieben diese Dimensionen seinem Ermessen anpassen kann; durch das hineingeschobene Rohr- (oder Fischbein-) Stäbchen wird der Sack offen gehalten; die Stelle desselben, an der sich das Rohr nicht befindet, drückt man an den Baumstamm und kratzt mit dem Kratzeisen Flechten, Moos, Rinde in den Sack, den man, sobald er gefüllt ist, zubindet und mit Musse zu Hause in der Wärme untersuchen kann. Man wird wohlthun, auf eine Excursion mehrere dergleichen Säcke mitzunehmen, zu denen man nur ein Rohr gebraucht. Dass diese Art der Jagd oft sehr lohnend ist, brauchen wir nicht erst hinzuzufügen.

Literarische Revue.

Mittheilungen des Münchener Entomologischen Vereins, I, 1877.

Reitter, über Merophysia Luc., Coluocera Motsch. und Reitteria Leder, 1—6. — Id., über die Gattungen Platamus und Telephanus Er., 7. — Id., neue Arten aus der Gattung Sitophagus Muls., 8—11. — Chevrolat, descr. d'une nouvelle espèce de Lampyride, 11. — Mélanges entomologiques sur les insectes du Portugal par M. Paulino d'Oliveira, angezeigt von Dr. L. von Heyden, 12—15. — v. Harold, Beschreibung einer neuen Leptinotarsa (Behrensi), 16. — Id., Uebersicht der Arten der

Gattung Aspicela, 17—21. — Reitter, neue Arten aus den Familien der Cucujidae, Nitidulidae, Colydiidae, Cryptophagidae, 22—28. — Stein, J. P. E. Fr., 3 merkwürdige Bernsteininsecten, 28—30. — Die columbinischen Chrysomelinen der Coleopterensammlung von E. Steinheil, 31—48. — Id., eine neue Ctenostoma (Landolti), 48. — Wagener, B., Cassididae, I. Die E. Steinheil'schen Sammlungen, 49—79. — Steinheil, E., neue columbische Elateriden aus Ocana, 79—84. — Dewitz, Dr. H., neue Schmetterlinge des Berliner Museums, 85—91. — Id., Dämmerungs- und Nachtfalter von Portorico, ges. von Hrn. Consul Krug, 91—96. — v. Harold, Coleopterorum species novae, 97—111. — Id., Beschreibung eines neuen Aphodius (scoparius), 112. — Id., nomenclatorische und synonymische Bemerkungen zur 2. Ausgabe des Catalogus Coleopterorum Europae, 113—125. — Reitter, Beiträge zur Kenntniss aussereuropäischer Coleopteren, 126—140. — v. Harold, Beschreibung eines neuen Carabus (Türhheimi), 141—42. — Sitzungsberichte und Mitgliederliste.

Insectorum, quae diptera appellantur, ab Joanne Schnabl, Henr. Dziedzicki, Joanne Wankowicz, Lud. Anders diversis Poloniae atque Minsciae Proncinciae locis collectarum, libellus a Dr. Joanne Schnabl conscriptus. Warschau, 1877.

Ein Catalog von 22 S. gr. Quart mit 1 neuen Genus (Microcephalus) und 1 neuen Species (Micr. Loewii), beschr. auf S. 23 und 24.

Annales de la Société Entomologique de Belgique, 1877, I. und II. Theil.

Chapuis, Dr. F. Espèces inédites de la Tribu des Hispides, 1—33; 47—57. — Lethierry, L. Relevé des Hémiptères recueillis en Portugal et en Espagne par M. C. von Volxem en mai et juin 1871, 34—43. — Jd. Relevé des Hémiptères recueillis dans les environs de Tanger (Maroc) par M. Camille van Volxem en juillet 1871, 44—46. — Millière, P. Jconographie et description de 6 espèces de Chenilles inédites des environs de Cannes (Alpes maritimes) avec leurs papillons à peine connus, 58—66. — Chapuis, Dr. F. Synopsis des espèces du genre Paropsis, 67.

The Entomologist. 1878. Jan. — Briggs, C. A. Variety of Satyrus Janira (mit Abbild.) — Power, John A. A Contribution to the entomology of Ireland, 2—8. — Hodgkinson, J. B. Entomological rambles, 8—12. — Ormerod, E. A. On the development of galls of Cecydomyia ulmariae, 12—14. — Descriptions of oak galls. Translated from Dr. G. L. Mayr's „Die Mitteleuropäischen Eichengallen", by E. A. Fitch, 14—16. — Smith, F. Notes on new and rare Hymenoptera, captured during the year 1877, 14—18. Kleinere Mittheilungen über Fang und Vorkommen von Insecten.

Systematisches Verzeichniss der Macro-Lepidopteren von Nord-Amerika. Nach den neuesten und besten Quellen zusammengestellt von Bernhard Gerhard. Leipzig, 1878. In Comm. bei R. Friedländer in Berlin. 158 S. u. 36 S. Register. 2 S. Nachträge.

Der erste Katalog nordamerikanischer Schmetterlinge in Deutschland und von einem Deutschen, so sehr sich auch schon deutsche Entomologen um die Lepidopterologie Nord-Amerikas verdient gemacht haben. Es ist natürlich, und der Verfasser spricht dies selber aus, dass mit den weiteren Forschungen die Zahl der aufgeführten Arten um ein Bedeutendes wachsen wird, trotzdem wird uns schon eine erkleckliche Summe namhaft gemacht. Wir finden 591 Arten Rhopalocera, 480 Sphingidae, 1154 Noctuae, 455 Geometridae angeführt. Die Nomenclatur ist nach den bei uns herrschenden Principien, abweichend von denen der Amerikaner durchgeführt. Wir können auch dem Verfasser nicht beipflichten, wenn er S. XII sagt: „und schreibt so gewiss ebenso logisch richtig Thais Rumina L., als die Gegner dieser Ansicht Thais Rumina F. schreiben". Jedermann bezieht logisch des L. oder F. auf das letzte Wort Rumina, und wenn die Amerikaner die Gattung hervorheben wollen, so müssen sie eben Thais F. Rumina L. schreiben. Wo sollte die Confusion aufhören, wenn jeder Gattungsschöpfer — und es giebt deren leider zu viele — eine Aenderung der Nomenclatur herbeiführen wollte. Linné und Fabricius haben öfter dieselben Namen verschiedenen Arten beigelegt, ich erinnere an Carabus hortensis; welchen Carabus sollte man denn unter C. hortensis L. verstehen, nemoralis Müll. oder hortensis L.? — Der Druck des Katalogs ist sehr splendide gehalten, je ein Name nebst Autor und Vaterland für eine Zeile der Seite, die Ausstattung gut, das Register sehr ausführlich. Ueber demselben ist der Druckfehler Speciorum geblieben.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1877, 2. — (Entomol. Inhalt.)

Lindemann, Prof. Dr. K. Monographie der Borkenkäfer Russlands. Die cryphalviden Tomiciden (Forts.) II. Die Gattung Stephanoderes, 159—173. III. Die Gattung Hypoborus, 174–187. — Chaudoir, baron de. Genres nouveaux et espèces inédites de la famille des Carabiques. Troncatipennes, 188—268. — Jakowlew, B. E. Hemiptera heteroptera von Astrachan (russisch, die Diagnosen neuer Arten deutsch). Nov. Spec.: Podops annulicornis, Cydnus oratulus, Scolopostethus Lethierryi, Engistus unicolor, Camptocera n. gen., C. Horvathi, Stenotus n. gen., St. sareptanus, Calocoris capitatus, Pachytoma rugicollis, Globiceps fuvicollis, G. albipennis, Orthotylus minutus, Amblyttyus concolor, Apocremnus albipes, Psallus cognatus, Pierostethus ciliatus. S. 269—300.

Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien, 1877, 1 Halbjahr. Mit 7 Tafeln. (Entomol. Inhalt.)

Löw, Dr. Franz, über Gallmücken, mit 1 Tfl., 1—38. Zwölf neue Arten sind beschrieben: Cecidomyia alni; C. genisticola; C. tortrix; C. sodalis; C. homocera; O. orobi; C. corrugans; Diplosis phillyreae; D. dryobia; D. anthobia; D. lonicerearum; Epidosis nigripes. — Kowarz, Ferd., die Dipterengattung Medeterus Fischer; mit 1 Tfl., 39—76. Acht neue Arten: Medeterus seniculus; dichaetus; glaucellus; obesus; dichrocerus; pinicola; dendrobaenus; petrophilus. — Löw, Dr. Franz, Beiträge zur Kenntniss der Psylloden, mit 1 Tfl., 123—54. Sechs neue Arten: Psylla pulchella; stenolabris; pyrastri; rhois; tripunctata; chrysanthemi. — Mair, Dr. G., die Chalcidiergattung Olinx, 155—164. Neue Arten: Olinx trilineata; pulchra; lineaticeps; obscuripes. — Reitter, Edm., Coleopterorum species novae, 165—94. Beschrieben sind 56 neue Arten, aus Europa Hypocoprus quadricollis, Gallia mer. — Mann, Josef, und Rogenhofer, Alois, zur Lepidopterenfauna des Dolomitengebietes, 491—500. Neu: Gelechia melantypella Mann; Lita apificella Mann. — Gredler, P. Vincenz, zur Käferfauna Central-Afrikas, 501—22.

The Scottish Naturalist, ed. by F. Buchanan White, M. D., F. L. S. Nr. XXIX. Jan. 1878. (Ent. Inh.).

Buchanan White, Glen Tilt; its Fauna aud Flora, 181—90. — Moncreiffe, Sir T., Bart., the Lepidoptera of Moncreiffe Hill., Forts., 191—98. — Insecta Scotica, Lepidoptera von Buchanan White, Coleoptera von Sharp, Forts., 216—28.

Comptes-Rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique. 1877.

Wir heben hieraus nur die zusammenhängenden, wichtigeren Mittheilungen hervor. — Febr. — Tournier, H. Tableau synoptique des espères européennes du genre Foenus F. Zusatz von Achille Costa: Notes sur quelque Foenus de l'Italie méridionale, in d. April. — Nr. — Mai. — Fauvel, Staphylinides du Brésil et de la Plata, recueillis par C. von Volxem. Mehrere neue Arten. — August. — R. Mac Lachlan, note sur l'insecte fossile décrit par M. P. de Borre sous le nom de Breyeria Borinensis. Erklärt das Insect für ein Neuropteron. — Putzeys, description de quelques Clivinides de l'Inde.

Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 4 Bd., 1 Hft. 1876.

Menge, Prof. A. Preussische Spinnen, IX. Fortsetzung. Mit 6 Tafeln Abbildungen (Photogr. Druck) S. 455—494.